


Salmonella en avicultura. Un problema, una solución



Según datos del Instituto Carlos III (BES Vol.13, 2005) en 2002 y 2003 el **74,5%** de los brotes de **salmonelosis en España** se produjeron por el **consumo de carne de pollo, huevos y derivados**.






Las autoridades sanitarias de la Unión Europea -a través de la Directiva 2003/99/CE del 17 de noviembre de 2003 sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos y del Reglamento (CE) N° 2160/2003 del 17 de noviembre de 2003 sobre el control de la *Salmonella* y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos-, establece la **obligatoriedad** de poner en marcha programas específicos para la detección y el **control de Salmonella**, y contempla medidas restrictivas para

aquellas explotaciones que no consigan los objetivos deseados.

Los datos publicados por la Comisión, año 2006, muestran que nuestro país presenta una tasa de prevalencia de *Salmonella* bastante elevada, sobre todo en gallinas ponedoras (productoras de huevos).

Tipo de producción	Prevalencia
Manadas de reproductoras producción de carne	24,22%
Manadas de reproductoras producción de huevos	2,60%
Ponedoras (<i>Salmonella</i> spp.)	70,0%
Ponedoras (Serovares Enteritidis y Typhimurium)	51,6%

La base de un **control exitoso** de estas infecciones parte del cumplimiento absoluto de las guías de buenas **prácticas de higiene**.

Situación	Solución
Agua de bebida	Tratamiento del agua de bebida en continuo con AQUAZIX Dosis 3Kg/100.000 litros
Sistema de distribución de agua -depósitos, tuberías y bebederos-	Limpeza y desinfección del sistema de tuberías con AQUAZIX Dosis 2% durante 3 horas en tuberías Depósito y bebederos, limpiar sin detergente y desinfectar pulverizando AQUAZIX al 5%
Vacío sanitario	Limpeza y desinfección de las instalaciones  Limpieza mecánica de la materia orgánica.  Aplicar CLEAN ZIX , detergente alcalino, a media-baja presión. Dosis 1 litro de disolución al 2%/ 5m ²  Aclarar para retirar el detergente, y esperar 6-12 horas para aplicar ZIX VIROX al 1%

