



s.p. veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60
Teléfono 977 850 170* - Fax 977 850 405 - 43330 **RIUDOMS** (Tarragona)

FICHA TÉCNICA

1. **NOMBRE:** HIDROCOL, 4.000.000 UI/ml

Registro Nº: 3451 ESP

2. **FÓRMULA:**

Cada ml contiene:

Sustancia activa:

Colistina (como sulfato) 4.000.000 UI

Excipientes:

Alcohol bencílico 0,010 ml

3. **ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:**

Bovino (terneros), ovino (corderos), porcino, pollos y pavos:

Tratamiento y metafilaxis de las infecciones entéricas causadas por *Escherichia coli* no invasiva susceptible a la colistina.

Debe confirmarse la presencia de la enfermedad en el rebaño antes del tratamiento metafiláctico.

4. **POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:**

Administración oral en agua de bebida o en leche.

Terminos, corderos y porcino: Administrar 100.000 UI de colistina/Kg p.v./día durante 3 – 5 días consecutivos, en el agua de bebida o en el lactoreemplazante en terneros, equivalente a 0,25 ml de solución concentrada por cada 10 Kg p.v. / día durante 3 – 5 días.

Pollos y pavos: Administrar 75.000 UI de colistina /Kg p.v. / día durante 3 – 5 días consecutivos, en el agua de bebida, 18,75 ml de solución concentrada por cada tonelada p.v. / día durante 3 – 5 días. La duración del tratamiento deberá limitarse al tiempo mínimo necesario para el tratamiento de la enfermedad.



Desechar el agua medicada que no se ha consumido durante 24 horas.

Desechar la leche medicada que no se ha consumido durante 3 horas.

5. TIEMPO DE ESPERA:

Terneros, corderos y porcino:

Carne: 1 día

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

Pollos y pavos:

Carne: 1 día.

Huevos: 0 días.

6. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. No conservar a temperatura superior a 25°C. Proteger de la luz.

7. OBSERVACIONES:

Uso Veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

8. PRESENTACIÓN:

Envases de 1 y 5 L.