



# Quinoxalina Syva

Anticoccidiósico  
en comprimidos



## Composición por comprimido

Sulfaquinoxalina (sódica)

250 mg

## Indicaciones

Tratamiento y prevención de la coccidiosis cecal y duodenal producidas por:

**Pollos:** *Eimeria tenella*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria mivati*.

**Pavos:** *Eimeria adenoeides*, *Eimeria meleagriditis* y *Eimeria gallopavonis*.

## Vía de administración

Oral, en el agua de bebida o pienso.

## Posología

Prevención:

1 comprimido por cada 2 litros de agua ó 2 kg de pienso, durante las 8 primeras semanas de vida.

Tratamiento:

**Pollos:** 8 comprimidos por cada 5 litros de agua ó 5 kg de pienso durante 2-3 días. Descansar 2 días y administrar 2 días más a razón de 1 comprimido por litro de agua ó kg de pienso.

**Pavos:** 1 comprimido por litro de agua o kg de pienso.

## Tiempo de espera

Carne: 21 días.

Huevos: No usar.

## Presentación

Envase con 1.000 comprimidos.

## Con prescripción veterinaria

Nº DE REGISTRO: 133-ESP