

LARVIPROX

LARVICIDA, OVICIDA Y ADULTICIDA, USO EN EL ENTORNO GANADERO

Larvicida-ovicida, con actividad adulticida, a base de piriproxifen, hormona de crecimiento (IGR) de última generación.

COMPOSICIÓN

Combinación sinérgica de Piriproxifen IGR con d-trans-Tetrametrina y Butóxido de piperonilo, en presencia de alcohol alifático y excipientes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: líquido
- Color: amarillento
- Olor: característico
- Densidad: 0,851 ± 0,03 g/ml
- Solubilidad: autoemulsionable en agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Larvicida con efecto adulticida.
- Actúa por ingestión y contacto.
- Efectos ovicida y larvicida proporcionados por la hormona del crecimiento
- En comparación con las piretrinas naturales, la d-Tetrametrina presenta una actividad muy superior, conservando, además, la baja toxicidad para mamíferos propia de los piretroides.
- El butóxido de piperonilo presente en la formulación actúa como sinergista, potenciando la actividad biocida del formulado.

ACTIVIDAD

Evita el progreso de los huevos y las larvas, a formas adultas. Su efecto adulticida inmoviliza las larvas de forma inmediata, y evita la puesta de huevos por parte de adultos.

DOSIS DE UTILIZACIÓN

- 1 ml de producto por m²
- En caso de estercoleros o fuertes infestaciones, aplicar a razón de 2 ml de producto por m².

APLICACIONES

Eliminación de larvas, huevos e insectos adultos, de aplicación sobre superficies en todo tipo de instalaciones del entorno ganadero y zoonosanitario.

Aplicar en:

- Estercoleros y zonas de cría y reproducción de insectos.
- Canales de recogida de purín
- Camas y zonas con excrementos.

MÉTODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto leer detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso:

- Disolver 100 ml de LARVIPROX en 10 litros de agua y aplicar la solución obtenida, repartiéndola uniformemente sobre una superficie de 100 m².
- No aplicar sobre superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y agua de bebida.
- Una vez aplicado el tratamiento, evitar el contacto de los animales con el producto.
- No deberá mezclarse con otros productos

TRATAMIENTO ESTERCOLEROS

Sobre una capa de estiércol de 1-2cm, se lleva a cabo una primera aplicación, pulverizando el producto LARVIPROX de forma uniforme, aplicándolo a la dosis indicada anteriormente

A los 15-25 días o cuando la capa de estiércol es de 4-5cm se lleva a cabo otra aplicación a la misma dosis.

PRECAUCIONES

Ver Ficha de Seguridad.

PRESENTACIÓN

Botellas de 250ml (en cajas de 6 botellas)

Botellas de 1 litro (en cajas de 6 botellas)

Bombonas de 5 litros (en cajas de 4 bombonas)

*Todos los formatos llevan incorporado un vaso dosificador.

REGISTROS Y NORMATIVA

D.R.P.: 17-0007060

R.O.P.Z.: 10038-P

R.O.E.S.P.: B0104E

Conforme a la Directiva Europea de Biocidas 98/8/CE

Conforme al Reglamento Europeo REACH 1907/2006/CE, 453/2010/EC y 2015/830/EU